

Orvos válaszol

Dr. Czeglédi Ágnes



Olvasónkat, K. Rezsónét 7-8 éve időnként erős hasmenés kínozza, mely nem jár sem lázzal, sem véres székürítéssel; a bélpanaszaira vonatkozólag szeretne tanácsot kérni.

Ezeket a tüneteket többnyire nagy idegesség, a stressz váltja ki. Az étkezésével valószínűleg nem függ össze, mert leírása szerint egészségesen táplálkozik. Ami viszont a fő rémület okozta: néhányszor előfordult, hogy nem tudta visszatartani.

Olvasónk leírja, hogy természetgyógyász előadását hallgatta a rádióban, és sok hasonló tünetet fedezett fel saját magán is: pl. evés utáni ásítózás, sok alvás, hideg lábak, fejbőrön kiütések, az édesség kívánása stb. Ezek nem tartoznak a vastagbélbetegségei közé. A leírtakból csak a széklethabitus változása, székrekedés és hasmenés váltakozása az, ami gyanút kell, hogy keltsen.

Sokszor semmi értékelhető panasz nincs a betegnek, akinél véletlen vizsgálat vagy szűrés vastagbélbetegséget talál.

A leírtak alapján én az úgynevezett irritábilis bélszindrómára gondolok, ez a vastagbél működésének a vegetatív idegrendszerrel összefüggő betegsége. Természetesen vizsgálat nélkül semmi biztosat mondani nem lehet.

Őn 85 éves, ebben a korban a kolonoszkópia nagyon megterhelő vizsgálat, komoly gyanú nélkül nem csinálják. A széklettartási probléma részben a korral járó izomgyengeséggel, részben a stresszel magyarázható.

Háziorvosa bizonyára ismeri problémáját, kíváncsi lennék, hogy ő hogy vélekedik. Legközelebbi hasmenés periódusnál kérjen széklet bakteriológiai vizsgálatot, véryomok keresését a székletben. A has áttapintása is nagyon fontos. Esetleg hasi ultrahang, bár az nem elég informatív vastagbélbetegség esetén. A kolonoszkópia csak akkor jön szóba, ha valami komolyabb gyanú van.

Régi palatetők felújítása
VILLAS. COLOR
bitumenes lemezekkel

Közvetlenül a gyártótól!

- 12 év vízzárósági garancia,
- ingyenes szaktanácsadás,
- megbízható kivitelezői lista a gyártó ajánlásával.

Hívja az Ön területi képviselőjét:

06 30 20 45 998

www.villascolor.hu



Szigeteljük velünk!
VILLAS.

Hamis AIDS-teszteket forgalmazznak



Fotó: MTI

A szexboltok polcain található AIDS-tesztek hamis eredményt mutatnak, ráadásul szabálytalanul árusítják őket – tudtuk meg Ócsai Lajostól, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Járványügyi Főosztály vezetőjétől.

Az erotikus boltokban forgalomba hozott AIDS-tesztek hiába gyorsak, mégsem nyújtanak megbízható eredményt. A gyorsaságnak ennél a fertőzésnél egyébként semmi előnyét nem látjuk, hiszen a fertőzéstől számított 6 héten belül nem lehet kimutatni, de 3 hónapon túl lehet csak teljes biztonsággal eredményt mondani.

Ezek a hamis tesztek Magyarországon nem bevizsgáltak, valahol Európában kaptak CE-jelet, és ez alapján forgalmazzák itthon. Holott a 2/2008-as Egészségügyi Miniszteri rendelet kimondja, hogy a HIV, valamint a Hepatitis B, C és D diagnosztizálásra szolgáló készülékeket csak intézeti gyógyszerárakban tarthatnak kizárólag fekvőbeteg gyógyintézeti

felhasználásra. Tehát gyakorlatilag csak a kórházakban és a kórházak patikájában található tesztek, még a háziorvosnál sem – magyarázza Ócsai Lajos, az ÁNTSZ Járványügyi Főosztály vezetője.

Az illegálisan árusított, hamis tesztek a minisztérium AIDS Bizottsága szerint azért is veszélyesek, mert a lakosság nincs lelkileg felkészülve az esetlegesen pozitív eredményre. Még nagy gyakorlattal rendelkező orvosoknak is traumát jelent közölni a beteggel

a rossz eredményt, gondoljuk csak el, mi történik, ha minderről a mellékhelettség falai között szerez valaki tudomást, emellett egyáltalán nem biztos, hogy az eredmény a valós helyzetet mutatja – magyarázza Ócsai Lajos, majd hozzáteszi, hogy az ujjbegyből vett vér tesztlejének az eredményei nagy százalékban hamisak.

Itthon az anonim AIDS-szűrést az ÁNTSZ, Országos Epidemiológiai Központjában, egy jelszó megadásával végzik, az eredmény pedig három munkanapon belül megvan. Itt lehetőség van arra is, hogy pozitív eredmény esetén az egyén rögtön az egészségügyi rendszerbe kerüljön.

Szerencsére hazánkban kevesebb, mint 1500 a HIV-fertőzötték száma, és a mai gyógyszerekkel jól szinten tartható a fertőzött állapota, így nem kell a betegségre jellemző tünetekkel számolni. Ha viszont valaki nem kapja meg a gyógyszeres kezelést, a fertőzéstől számított tíz éven belül szinte biztosan meghal. **Gógh Csilla**

Nyilvántartott HIV-fertőzötték száma

2000	48 fő
2001	82 fő
2002	78 fő
2003	63 fő
2004	75 fő
2005	106 fő
2006	81 fő
2007	119 fő

HÍREK

Modern szívvizsgálat

Tavaly az Európai Unióban 1,9 millióan, míg Magyarországon 70 ezren haltak meg szív- és érrendszeri megbetegedésben. A katéteres vizsgálatot kiváltó számítógépes Cardio-CT-eljárást a nagyobb hazai szívcentrumokban már sikeresen alkalmazzák, de a társadalombiztosítás nem fizeti a beavatkozás költségét, mely közel 160 ezer forint.

A drága placebo jobban hat

Amerikai kutatók hatástalan fejfájáscsillapítót adtak a fejfájós pácienseknek. Az egyik pirulát átszámítva 450 forintért, a másikat pedig mindössze 17 forintért adták. Azok, akik azt hitték, hogy a drágább gyógyszert szedték, 85 százalékban állították, hogy javult az állapotuk, míg az olcsóbb „gyógyszerek” csak 61 százalékban bizonyultak hatásosnak.

Veszélyek báránnyőrben

Több mint 600 óvoda és bölcsőde, valamint 300-nál több orvos működött együtt az Egészséges Ifjúságért Alapítvány tájékoztató programjában, hogy minél több szülő figyelmét felhívják arra, a báránnyíló ma már nem ugyanaz a betegség, mint nagyanyáink korában volt, egyre több a szövődmény, így fontos, hogy elkerüljük a megfertőződést!